Obs. sur une luxation compliquée du pied.

Un bénédictin de l'abbaye de St. Nicolas aux bois, près Laon, âgé d'environ trente six ans, d'une forte constitution, et d'un embonpoint assez considérable, fit une chûte sur le côté droit, le soir en rentrant chez lui; et le pied du même côté glissa dans une ornière, où il se trouva pris comme dans un étau. il se fit une luxation en dedans, de manière que l'extrémité inférieure du tibia qui forme la malléole interne, sortit de sa cavité en déchirant les ligamens et en perçant les tégumens en travers, ce qui produisit une plaie de plusieurs pouces de long, dans laquelle la malléole faisoit une saillie de près de trois pouces. Cet accident est arrivé le 2 novembre dernier, (1790), et je n'ai vû le malade que 20 heures après sa chûte. je fis la réduction suivant les règles de l'art; et pour replacer l'os, je me servis d'une spatule,

ARC 41 n° 26

dans j'introduisis une des extrémités dans le bord inférieur de la plaie, qui étoit comme recoquillé en dedans, afin de le dégager de dessous la malléole tandis que j'appuyois de l'autre main sur celle-ci pour la faire rentrer dans sa cavité. Cette opération ne fut pas longue; et, je m'assurai que l'os étoit bien réduit, par les différens mouvemens que je fis faire au pied. je pansai ensuite la plaie simplement, et j'appliquai un bandage à plusieurs chefs, composé de trois ou quatre compresses, placées sur un drap roulé pour éviter de remuer la jambe. le malade a été saigné trois fois dans les douze heures qui ont suivi la réduction, et il fut mis à une diète sévère. il ne survint presque point d'accidens primitifs, excepté un peu de gonflement inflammatoire, sans beaucoup de douleurs; mais, le

neuvieme du dixieme jours, le gonflement et l'inflam-
mation augmenterent au point qu'il se forma en
peu de tems des phlictaines tout autour de la jambe,
ainsi qu'un dépôt considérable à sa partie externe
et inférieure. ~~[illegible]~~, le long du péroné. je
l'ouvris dans l'endroit le plus déclive, et dans une
assez grande étendue pour vuider complettement
le foyer. Le pus venoit du côté du ligament
interosseux qui avoit été vraisemblablement en
partie déchiré, à sa partie inférieure: Et, pour
empêcher le nouveau pus de séjourner dans le vuide
qui étoit derriere le péroné et la malléole externe
j'appliquai des compresses, expulsives qui servient
en même tems de remplissage, ce qui a produit
l'effet que j'en attendois; car, par ce moyen le
pus sortit librement et il ne s'est pas formé
d'autres dépôts. j'avois soin, à chaque panse-
ment, de faire de légeres pressions vers l'ouverture
de l'abscès, pour en faire sortir le pus. La plaie

interne par laquelle la malléole étoit sortie, fournissoit une suppuration qui venoit de l'articulation, et cependant elle a été cicatrisée presqu'en même tems que la plaie externe, au bout de deux mois et demi. avant la fin du troisieme mois, le malade commençoit à se soutenir sur sa jambe, moyennant des béquilles, et maintenant il marche facilement sans bâton, quoique les mouvemens du pied soient gênés, surtout celui de flexion. les mouvemens latéraux sont les moins sensibles; mais ceux d'extension et de flexion se font plus facilement depuis un mois, tant par l'usage des bains émolliens, que par l'exercice, sans occasionner la moindre douleur, malgré les fréquens changemens de tems.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE